



PROMEMORIA PRENOTAZIONE

ha prenotato :

Tel :

N° PR. **IN DATA** **ALLE** **PRESTAZIONE PRENOTATA**

PREPARAZIONE COLONSCOPIA

PRESENTARSI PRESSO:

Servizio di Endoscopia (piano terra ala A)

PRECAUZIONI DIETETICHE PER LA COLONSCOPIA:

Non assumere frutta e verdura nei 3 giorni precedenti l' esame.

Nessun cibo solido nelle 3-4 ore **precedenti l' inizio della preparazione** fino all' esecuzione dell'indagine (nessun cibo solido a partire dalle ore 13)
Si possono bere liquidi (caffè, the, brodo, camomilla, succhi di frutta senza residui, acqua, anche con aggiunta di zucchero) fino a 2 ore prima dell' esame.

In particolare evitare assunzione di cibi ricchi di scorie come uva, kiwi, fichi, verdura cotta, cruda ed insalate almeno tre giorni prima della colonscopia.

MODALITA' DI PREPARAZIONE ED ASSUNZIONE:

Seguendo le indicazioni del foglietto illustrativo, contenuto nella confezione del prodotto, preparare, dopo aver acquistato in farmacia

PLENVU (Macrogol 3350 + Solfato di sodio) Seguire le istruzioni del foglietto illustrativo per ESAME AL MATTINO (iniziare la preparazione il pomeriggio del giorno prima ed al mattino dell' esame)

Oppure :

MOVIPREP (Macrogol 3350 + Solfato di sodio) Seguire le istruzioni del foglietto illustrativo per ESAME AL MATTINO (iniziare la preparazione il pomeriggio del giorno prima ed al mattino dell' esame)

Non assumere questi preparati in caso di fenilchetonuria o favismo accertati La preparazione e' efficace solo se esce liquido limpido.

Nei pazienti stitici e' indicato aumentare fino al 50% i litri di soluzione.

Agitare bene affinche' il granulato sia completamente sciolto e la soluzione limpida. Il liquido e' piu' gradevole se rinfrescato (non ghiaccio).

Per la sospensione di farmaci antiaggreganti o Nuovi Anticoagulanti o Dicumarolici

L' acido acetilsalicilico puo' essere proseguito sia per le gastroscopie che per le colonscopie.

1 – altri antiaggreganti piastriatrici (Ticlopidina, Clopidogrel, ecc.) evono essere sospesi 7 (sette) giorni prima dell' esame, sempre previa valutazione del proprio Medico Curante o Cardiologo, sulla base del rischio trombo-embolico.

2 – se in terapia con Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO), quali Dabigatan, Rivabroxaban, Apixaban, Edoxaban, ecc. la sospensione va fatta almeno 48 ore prima dell' esame (sempre previa consultazione-approvazione del medico Curante o del proprio Cardiologo)

3 – se in terapia con Anticoagulanti Orali (Dicumarolici) questi vanno sospesi 5 (cinque) giorni prima dell' esame e sostituiti con eparine a basso peso molecolare (non somministrate la mattina dell' esame), sempre previa consultazione con il centro TAO di riferimento o con il Medico Curante o con il

- In caso di impedimento si prega di avvisare in anticipo.
- Per le prestazioni riconducibili al S.S.N. è necessaria la richiesta del medico di base o dello specialista, e la nuova tessera sanitaria magnetica.
- Per una migliore definizione dell'esame portare tutta la documentazione precedente.
- Si prega di rispettare l'orario indicato e consegnare all'atto della prestazione sia l'impegnativa che la prenotazione.
- Prima dell'esecuzione dell'esame il paziente si deve sempre presentare presso l'ufficio Cassa (aperto tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 17,30) per l'accettazione o il pagamento (effettuabile tramite contanti, bancomat, carta di credito o assegno).

proprio Cardiologo nella valutazione di eventuali controindicazioni alla sospensione. Indispensabile eseguire PT ed INR prima dell' esame.